

## الآباء ،للمرضى التطعيممعلومات موقع بك الخاص BCG بلقاح العناية الرعاية ومقدمي والأمهات

تطوير تم .عامًا 16 سن تحت أطفالاً يكونون ما عادة هؤلاء - BCG لقاح يتلقون الذين للأشخاص مخصصة النشرة هذه شكل على ويحتوي ،(ليل) باستور معهد في وغيان كالميت بواسطة (BCG) Bacille Calmette-Guérin الحماية بعض تطوير على يساعدك ولكن السل مرض يسبب لا .السل مرض تسبب التي (الجراثيم) البكتيريا من ضعيف به اتصال على كنت إذا المرض ضد

ستختفي "فقاعة" صغيرة بيضاء طبقة ينتج الجلد من الخارجية الطبقة في حقنه يتم الذي اللقاح BCG تطعيم بموقع العناية بعد أسابيع 2-8 بين يكون ما عادة ،الحقن موقع في فعل رد BCG لقاح يسبب ،الحالات معظم في دقيقة 20 خلال من السوائل تتسرب أن جدًا الطبيعي من .(قيح) لزج سائل يتطور قد على تحتوي ما غالبًا ،صغيرة حمراء كتلة .التطعيم يستغرق قد .ندبة وتترك تسقط ثم سوف والتي جرب وستتشكل قشرة تكوين إلى النهاية في هذا سيؤدي .صدید المنطقة مؤلم إنه إلى ذلك سيؤدي .الجرب أو الموقع غسل أو خدش أو طرق أو بتقشير تقم لا التام الشفاء أشهر أو أسابيع هذا على المستحضرات أو الكريمات تستخدم لا .أكبر ندبة تسبب بالعدوى ذلك بعد يصاب وقد .للشفاء أطول وقتًا وسيستغرق لا .الإمكان قدر إليه الوصول الهواء وترك جافًا BCG بال تطعيم موقع على الحفاظ المهم من.شفاءه تم حتى الموقع السترات مثل للحكة والمسببة الضيقة الملابس تجنب ولكن ،ذلك إلى بحاجة كنت إذا إذا خفيفة ملابس ارتدي .تغطيه بجص المكان بتغطية قم ،تسبح كنت إذا كنت إذا .بالماء غارقة تجعلها ولا باستمرار مبللة المنطقة تجعل لا.الصوفية لا ،الاستحمام أو الاستحمام عند لـ .برفق الجلد وجفف ذلك بعد ممكن وقت أسرع في الجبس بوضع قم إزالة .للماء مقاوم للهواء معرضًا واتركه ذلك بعد بتجفيفه قم ،أخرى مرة .فركها عدم على احرص ولكن المنطقة بتغطية تقم

أطول تكون قد أنها من الرغم على ،أسابيع عدة بعد .مشاكل أي BCG ب التطعيم موقع يسبب أن ينبغي لا ،الحرص مع الوقت مرور مع ببطء تتلاشى صغيرة وسوف حمراء علامة واترك انزل .القشرة تختفي أن يجب ،الأحيان بعض في صغيرة ندبة ترك

نادرة حالات في تحدث قد أو الرقبة أو الوجه في تورم/احمرار) الشديدة التحسسية الفعل ردود المحتملة الجانبية الآثار 10 بعد-5 لمدة الانتظار غرفة في الجلوس منك سيطلب أنت .(التنفس صعوبة ،الجلدي الطفح ،الإسهال ،الغثيان :مثل) الآثار.ذلك حدوث حال في المساعدة العاجلة الطبية المساعدة على للحصول اليد متناول في أنك من للتأكد لقاح دقائق بحيث الإبط تحت الليمفاوية الغدد حالة) • حمى. • تورم 100 كل من 1 من أقل في تحدث قد) :الشائعة غير الجانبية (قد) :النادرة الجانبية الآثار .سم 1 من أكثر قطرها يبلغ الحقنة موقع في سوائل تفرز سم. • قرحة 1 عن حجمها يزيد بكتيريا الأحيان. • العدوى بعض في نزيف مع ،الليمفاوية الغدد حالة) • التهاب 1000 كل من 1 من أقل في يحدث الجسم أنحاء جميع في تنتشر أن يمكن والتي ،اللقاح

ينصح لا ،الوقت ثانية مرة اللقاح إعطاء حالة في سلبية فعل ردود حدوث خطر بسبب BCG ضد التطعيم تكرار BCG لقاح إعطاء عند الظاهرة هذه تظهر يكون التسرب بعض حدث لو حتى ،التطعيم بتكرار

الموقع شفاء يتم حتى أو ،أشهر ثلاث لمدة BCG مع الذراع نفس في شخص أي حقن يتم لا إضافية نصائح

السل مكافحة بفريق بالاتصال فنوصيك ،بالقلق تشعر كنت إذا أو ،BCG ضد التطعيم موقع مع مشاكل تواجه كنت إذا 0118 322 6882 :الرقم على الجمعة إلى الاثنين من العمل ساعات خلال أولاً

www.royalberkshire.nhs.uk بزيارة تفضل ،مؤسستنا عن المزيد لمعرفة

التنسيق أو اللغة آخر مكان في المعلومات هذه إلى بحاجة كنت إذا السؤال يرجى

المراجعة موعد 2025 يناير :المراجعة تمت 2008 يناير ،التنفسي الجهاز طب قسم ،السل لمكافحة بيركشاير خدمة 2027 يناير :القادمة

<https://www.gov.uk/government/publications/tb-bcg-and-your-baby-leaflet>