

Problemy z przetoką lub grafem: sposób postępowania

W przypadku gdy przetoka lub graft naczyniowy zacznie nadmiernie krwawić, a miejsca nie można docisnąć w taki sposób, aby zatrzymać krwawienie, **NALEŻY KONIECZNIE ZADZWONIĆ POD NUMER 999** i zgłosić się do najbliższego oddziału pogotowia (A&E department). Personel pogotowia może skontaktować się z placówką hemodializ lub Oddziałem Victoria (Victoria Ward) w celu uzyskania dalszych wskazówek.

Należy zachować właściwą higienę, aby zapobiec infekcjom

- Ramię należy utrzymywać w czystości. Przed każdą z sesji dializowania przed wprowadzeniem igieł zostaną Państwo poproszeni o umycie ręki z przetoką/ grafem wodą z mydłem i jej dokładne osuszenie,
- Nie należy skubać strupów z boków igły ani drapać ręki.
- Jeśli którakolwiek z części ramienia z grafem lub przetoką zacznie boleć, zauważymy jej zaczerwienienie lub proces zapalny, należy skontaktować się z placówką nefrologiczną lub w razie potrzeby, po godzinach pracy placówki, z Oddziałem Victoria (Victoria Ward).

Inne problemy lub powikłania związane z przetoką lub grafem

- W przypadku przecieku krwi w miejscu wkłucia igły, należy zastosować mocny nacisk. Jeśli krwawienie nie ustąpi w ciągu 15 minut, należy skontaktować się telefonicznie z jednostką nefrologiczną w celu uzyskania wskazówek. Jeśli wydarzy się to po godzinach pracy, należy skontaktować się z Oddziałem Victoria (Victoria Ward).
- Należy codziennie sprawdzać, czy przetoka lub graft „brzęczy”, co wskazuje na ich prawidłowe funkcjonowanie. Zjawisko to nosi nazwę dreszczu lub szmeru. Jeśli szmer uległ zmianie, jest słaby lub nie występuje, należy natychmiast skontaktować się z placówką dializ lub Oddziałem Victoria (Victoria Ward).
- Na ramię z przetoką lub grafem nigdy nie należy zakładać mankietu do mierzenia ciśnienia.
- Na ręce z przetoką lub grafem nie należy nosić zegarków ani ciasnych mankietów.
- Przetokę lub graft można wykorzystywać wyłącznie do hemodializ. Ani z graftu ani z przetoki nie należy pobierać krwi, nie należy też do nich podawać leków dożylnych.
- Ręką z przetoką lub grafem nie można podnosić ciężkich przedmiotów (np. toreb z zakupami). Nie należy również wykonywać ćwiczeń siłowych ani innych tego typu czynności. Podczas wykonywania prac w ogrodzie lub innych tego typu czynności należy zachować ostrożność, aby nie zadrapać i nie pobrudzić ręki.

- Należy zachować ostrożność, aby nie uderzać ani nie przeciąć przetoki lub graftu.
- W przypadku wystąpienia krwawienia i wymiotów, może nastąpić szybkie odwodnienie i przetoka lub graft przestaną funkcjonować. Należy regularnie sprawdzać występowanie szmeru/ brzęczenia. W przypadku wykrycia problemów należy skontaktować się telefonicznie z Oddziałem Victoria (Victoria Ward).
- W przypadku znacznego obniżenia ciśnienia krwi lub odwodnienia przetoka lub graft mogą przestać funkcjonować. Jeśli „brzęczenie” ulega zmianie, należy skontaktować się telefonicznie z placówką hemodializ lub Oddziałem Victoria (Victoria Ward).

Benyon Dialysis Unit (Oddział Dializ Benyon):	0118 322 8360
Bracknell Dialysis Unit (Oddział Dializ Bracknell):	01344 662961
CAPD Unit (Oddział CAPD):	0118 322 8555
Huntley & Palmer Dialysis Unit (Oddział Dializ Huntley i Palmer):	0118 322 8519
Kidney Care Nurses (Pielęgniarki nefrologiczne):	0118 322 7899
Transplant Nurses (Pielęgniarki transplantologiczne):	0118 322 5111 pager 40593
Windsor Dialysis Unit (Oddział Dializ Windsor):	01753 866008

**Jeśli powyższe oddziały nie pracują, należy skontaktować się z:
Victoria Ward (Oddziałem Victoria): pod numerem 0118 322 7462 lub 0118 322 7476.**

Informacje dodatkowe

informacje dodatkowe dostępne są w następujących serwisach internetowych:

www.britishkidney-pa.co.uk/patient-info

www.beaumont.ie/kidneycentre-forpatients-aguidetodialysis-accessfo

www.kidneypatientguide.org.uk

Royal Berkshire NHS Foundation Trust

London Road

Reading RG1 5AN

Telefon 0118 322 5111

www.royalberkshire.nhs.uk

REN_1228

Renal Medicine, październik 2013 r.

Termin następnej aktualizacji: październik 2015 r.