



Royal Berkshire
NHS Foundation Trust

Cuidados com o local da sua vacina BCG

Informações para pacientes,
pais e responsáveis

Este folheto se destina a pessoas que são vacinadas com BCG - geralmente crianças com menos de 16 anos, mas os adultos também podem ser vacinados. O Bacilo de Calmette-Guérin (BCG) foi desenvolvido por Calmette e Guérin no Instituto Pasteur (Lille) e contém uma forma enfraquecida das bactérias (germes) que causam tuberculose (TB). Ela não causa tuberculose, mas ajuda a desenvolver alguma proteção contra a doença, caso você entre em contato com ela.

Cuidados com o local da vacina BCG.

A vacina injetada na camada externa da pele produz uma pequena bolha branca, que não deve ser mexida. Ela vai desaparecer em cerca de 20 minutos. Na maioria dos casos, a vacina BCG causa uma reação no local da injeção, geralmente entre 2 a 8 semanas após a vacinação. Um pequeno nódulo vermelho pode se desenvolver, geralmente contendo pus, com escamação e formação de bolhas no local. É bastante normal que vaze um líquido pegajoso na área. Isso eventualmente irá acabar e uma crosta se formará. Pode levar semanas ou meses para curar completamente o local

Não cutuque, bata, arranhe ou lave o local ou a crosta. Ele ficará dolorido e levará muito mais tempo para curar, podendo ficar infectado e causar uma cicatriz pior.

É importante manter o local da vacinação BCG seco e deixar ao ar livre o máximo possível. Não o cubra, use roupas leves se necessário, mas evite roupas apertadas e que possam causar coceira, como blusas de lã.

Evite molhar a área e certamente não a deixe encharcada. Se você for nadar, cubra o local com um curativo à prova d'água. Remova o curativo

o mais rápido possível depois, seque a pele e deixe ao ar livre. Ao tomar banho não cubra a área, mas tome cuidado para não a esfregar. Mais uma vez, seque o local e deixe ao ar livre.

Com cuidado, o local da vacinação BCG não deve causar problemas. Depois de algumas semanas, embora algumas vezes com mais tempo, a crosta deve cair e deixar uma pequena marca vermelha que desaparecerá lentamente ao longo do tempo, deixando uma pequena cicatriz.

Possíveis efeitos colaterais:

Reações alérgicas graves (vermelhidão/inchaço do rosto, pescoço ou garganta; erupções cutâneas; dificuldades respiratórias) podem ocorrer em casos raros. Você será solicitado a se sentar na sala de espera por 5 a 10 minutos após a vacina para garantir acesso fácil a assistência médica urgente, caso isso aconteça.

Efeitos secundários incomuns: (pode ocorrer em menos de 1 em 100 casos)

- Febre.
- Inchaço dos gânglios linfáticos na axila com mais de 1 cm de diâmetro.
- Uma úlcera vazando do no local da injeção com mais de 1 cm de diâmetro.

Efeitos colaterais raros: (pode ocorrer em menos de 1 em 1.000 casos)

- Inflamação dos gânglios linfáticos, às vezes com úlceras escorrendo.
- Infecção com a bactéria da vacina que pode se espalhar por todo o corpo.

Repetir a vacinação BCG

Se a enfermeira ou obstetriz acreditar que a vacina vazou bastante ao ser administrada, ela documentará isso na caderneta de saúde do bebê. Se não ocorreu nenhuma reação no local após 10 semanas, podemos considerar a repetição da vacina.

Conselhos adicionais:

Não tome injeções no mesmo braço que a vacina BCG por 3 meses ou até que o local esteja curado.

Se estiver enfrentando problemas com o local da vacina BCG ou estiver preocupado, recomendamos que entre em contato com a equipe de Tuberculose durante o horário de trabalho de segunda a sexta-feira no número:

0118 322 6882

Royal Berkshire NHS Foundation Trust

London Road

Reading RG1 5AN

0118 322 5111 (central)

www.royalberkshire.nhs.uk

Este documento pode ser disponibilizado em outros idiomas e formatos, mediante solicitação.

Serviço de Tuberculose de Berkshire, Departamento de Medicina Respiratória, janeiro de 2008

Revisado em: Julho de 2019

Próxima revisão: Julho de 2021